




ISO - Prévenir les infections du site opératoire



DATE (jj/MMM/aa): _____ / _____ / _____



A. Type de chirurgie	<input type="radio"/> Cardiaque avec pompe	<input type="radio"/> Césarienne	<input type="radio"/> Gynécologique	<input type="radio"/> Orthopédique	<input type="radio"/> Vasculaire
	<input type="radio"/> Cardiaque sans pompe	<input type="radio"/> Chirurgie générale	<input type="radio"/> Ophtalmologique	<input type="radio"/> Thoracique	<input type="radio"/> Autre
B. Classe de chirurgie	<input type="radio"/> Propre (I)	<input type="radio"/> Propre-contaminée (II)	<input type="radio"/> Contaminée (III)	<input type="radio"/> Sale (IV)	<input type="radio"/> Non Consigné
C. Douche ou bain préopératoire avec savon ou agent antiseptique	<input type="radio"/> Savon	<input type="radio"/> Antiseptique	<input type="radio"/> Douche ou bain non requis	<input type="radio"/> Aucun douche/bain	<input type="radio"/> Non Consigné
D. Solution employée pour le nettoyage peropératoire de la peau intacte	<input type="radio"/> 2% de chlorhexidine et 70% d'alcool	<input type="radio"/> Polyvidone iodée avec de l'alcool	<input type="radio"/> Polyvidone iodée pour la tête et le cou	<input type="radio"/> Contre-indication	<input type="radio"/> Non consigné
	<input type="radio"/> Chlorhexidine	<input type="radio"/> Polyvidone iodée	<input type="radio"/> Autre	<input type="radio"/> Ne s'applique pas	
E. Administration d'antibiotiques en prophylaxie	<input type="radio"/> Dans les 60 minutes précédant l'incision chirurgicale	<input type="radio"/> Aucun de ces choix	<input type="radio"/> Antibiotiques non indiqués		
	<input type="radio"/> Dans les 120 minutes précédant l'incision, dans le cas de la vancomycine ou de la fluoroquinolone	<input type="radio"/> Aucun antibiotique n'a été administré	<input type="radio"/> Non consigné		
F. Une dose de céfazoline en antibioprofylaxie a été administrée (adultes seulement)	<input type="radio"/> Posologie en fonction du poids pour les patients en pédiatrie	<input type="radio"/> <1 g pour tout patient adulte	<input type="radio"/> Autre antibiotique		
	<input type="radio"/> 1g <80kg	<input type="radio"/> 1g >=80kg	<input type="radio"/> 2g <80kg	<input type="radio"/> 2g 80-120kg	<input type="radio"/> 2g >120kg
	<input type="radio"/> 3g <120kg	<input type="radio"/> 3g >=120 kg	<input type="radio"/> >3g	<input type="radio"/> Aucun antibiotique n'a été administré	<input type="radio"/> Non consigné
G. Administration appropriée d'un redosage d'antibioprofylaxie conformément aux lignes directrices	<input type="radio"/> Aucune antibio prophylaxie administrée	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Redosage non requis	<input type="radio"/> Non consigné
H. Cessation de l'antibioprofylaxie	<input type="radio"/> Aucun antibiotique administré après la fin de l'intervention	<input type="radio"/> L'administration des antibiotiques a cessé dans les 24 heures suivant la fin de la chirurgie	<input type="radio"/> L'administration des antibiotiques a cessé plus de 24 heures après la fin de la chirurgie	<input type="radio"/> Aucun antibiotique n's été administré	<input type="radio"/> Non consigné
I. Méthode d'épilation	<input type="radio"/> Épilation non requise	<input type="radio"/> Tondeuse	<input type="radio"/> Dépilatoire	<input type="radio"/> Rasoir	<input type="radio"/> Épilation effectuée à la maison
J. Glycémie inférieure à 11,1 mmol/L les jours postopératoires 0, 1 et 2	<input type="radio"/> N'est pas à risque	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Glucose non établi	<input type="radio"/> Non consigné
K. Température à la fin de la chirurgie ou à l'arrivée à la salle de réveil entre 36,0 et 38,0 °C	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Hypothermie induite	<input type="radio"/> Non consigné	

Question	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Meilleures Pratiques (Score 0 or 1)									

Consultez les instructions détaillées pour obtenir des directives pour remplir le formulaire de collecte de données et calcul des résultats. Des instructions sont disponibles dans le paquet de mesures de Soins de santé plus sécuritaires maintenant!

